

اونٹوں کے قد کے لحاظ سے ان کی اقسام

اونٹ کے قد کے لحاظ سے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔

(۱) **Protylopus** اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے جو 50-40 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں رہتی تھی۔ قدیم ترین اونٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ سب سے چھوٹا اونٹ ہے جس کا قد ۲۳ انچ تک ہوتا ہے اور تقریباً اس کا وزن تقریباً 26 کلو گرام ہوتا ہے۔

(۲) **Huacaya** لاماکا کی ایک نسل ہے جسے عام طور پر الپاکا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنوبی امریکی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کا قد ۳۹ انچ تک ہوتا ہے۔

(۳) **ویکونا** ایک جنگلی جنوبی امریکی اونٹ ہے، جو اینڈیز کے اونچے پائے علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ شمالی امریکہ کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ان کا قد ۳۳ انچ تک ہوتا ہے۔

(۴) **Poebrotherium** شمالی امریکہ میں رہنے والے اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے۔ وہ تقریباً 32 ملین سال سے موجود ہیں۔ ان کا قد امیٹر تک ہوتا ہے۔

(۵) **Huacaya alpaca** لاماکا کی نسل ہے جسے عام طور پر الپاکا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 4000 میٹر کی بلندی پر **Altiplano** پر رہتا ہے۔ ان کا قد امیٹر تک ہوتا ہے۔

(۶) **سوری الپا** کا نرم اون کے اونٹ رکھنے والے اونٹ ہیں ان کا قد امیٹر تک ہوتا ہے۔

(۷) **گوانا** کو ایک اونٹ ہے جو جنوبی امریکہ کا ہے۔ ان کا قد ۲ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۸) **پروکیمیلس** اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے جو شمالی امریکہ میں ممتا می ہے۔ وہ تقریباً 11 ملین سالوں سے موجود ہیں۔ ان کا قد ۳ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۹) **لاما** ایک پالا ہوا جنوبی امریکی اونٹ ہے، جو بڑے پیمانے پر گوشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے پاس نرم اون ہے۔ ان کا قد ۳ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۰) **Palaeolama** اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے۔ یہ شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا قد ۱.۷ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۱) **Hemiauchenia** اونٹوں کی ایک نسل ہے جو تقریباً 10 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں رہتی تھی۔ ان کا قد ۱.۷ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۲) **جنگلی Bactrian** اونٹ شمال مغربی چین اور جنوب مغربی منگولیا کے کچھ حصوں میں رہنے والے اونٹوں کی ایک انتہائی خطرے سے دوچار نسل ہے۔ ان کا قد ۲ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۳) **جیلمیری اونٹ** ہلکے وزن کی اچھی در سٹائل نسل ہے جو تیز کام اور اچھی رفتار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا قد ۲ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۴) **کھرائی اونٹ** کی ایک نایاب نسل ہے جو بھارت کی مغربی ریاست گجرات کے ضلع کچ کے نمگین دلدل میں پائی جاتی ہے۔ ان کا قد ۲ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۵):

عربی اونٹ، یا ایک کوہان والا اونٹ۔ یہ اونٹ کی تین اقسام میں سب سے لمبا ہے۔ اس نسل کے نر اونٹوں کا قد 2.2-3.6 میٹر تک ہوتا ہے، جبکہ مادہ کا قد 1.7-1.9 میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۶) **گھریلو Bactrian** اونٹ یا دو کوہان والا اونٹ، وسطی ایشیا کے میدانوں کا ایک بڑا مقامی اونٹ ہے۔ ان کا قد ۲ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۷) **Paracamelus** اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے۔ اس کی ابتدا تقریباً 6.5-7.5 ملین سال پہلے شمالی امریکہ میں ہوئی۔ ان کا قد ۲-۶ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۸): *Aepyamelus* اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے جو تقریباً 15.7 ملین سال پہلے سے موجود تھی۔ ان کا قد ۳ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۱۹): *Camelus knoblochi* اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے۔ وہ مشرقی یورپ کے جنوب سے، شمالی تازقستان کے مشرق اور مغرب میں موجود تھے، ان کا قد ۳ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۲۰): *Gigantocamelus* ایک بڑا امریکی اونٹ ہے۔ یہ 4.9 mya سال پہلے شمالی امریکہ کی سرزمین پر رہتا تھا۔ ان کا قد ۳ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۲۱): *Titanotylopus* اونٹ کی ایک معدوم نسل ہے۔ وہ شمالی امریکہ میں رہ رہے تھے۔ ان کا قد ۳-۵ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۲۲): *Megacamelus* ایک معدوم نسل کا اونٹ ہے۔ وہ تقریباً 5.4 ملین سالوں سے موجود تھے۔ ان کا قد ۳-۷ میٹر تک ہوتا ہے۔

(۲۳): *epycamelus* اونٹوں کی ایک معدوم نسل ہے۔ وہ تقریباً 20.5 ملین سال تک موجود تھے۔ ان کا قد ۴ میٹر تک ہوتا ہے۔

از قلم: محمد نواز رضوی